

EMBARAZO Y FENTANILO

El fentanilo es un potente opiáceo sintético y adictivo que se utiliza para el tratamiento del dolor intenso y que, en los últimos años, comenzó a aparecer con cada vez más frecuencia en el mercado ilícito de drogas.^{1,2} Incluso en dosis muy pequeñas, puede resultar letal y el fentanilo de fabricación ilegal (illegally made fentanyl; IMF, por sus siglas en inglés) está vinculado con la mayoría de los casos recientes de sobredosis relacionadas con fentanilo. El IMF se agrega a menudo a drogas como la heroína, la cocaína y la metanfetamina, o se fabrica en comprimidos falsos de venta con receta.^{2,3,4} Muchas personas no son conscientes de que sus medicamentos están mezclados con fentanilo.³



USO EN EL EMBARAZO

Aunque la información específica sobre los resultados maternos y fetales del fentanilo es actualmente limitada, el consumo de otros opiáceos durante el embarazo se relacionó con el bajo peso al nacer, los partos prematuros y el síndrome de abstinencia neonatal (neonatal abstinence syndrome; NAS, por sus siglas en inglés), un grupo de afecciones que pueden producirse cuando los recién nacidos dejan de consumir ciertas sustancias, incluido el fentanilo. Los síntomas del NAS pueden incluir irritabilidad, falta de sueño, somnolencia extrema, mala alimentación, convulsiones y reflejos hiperactivos.^{5,6}

SOBREDOSIS EN EL EMBARAZO

La naloxona es un medicamento que salva vidas y puede revertir una sobredosis de opiáceos, incluido el fentanilo. La naloxona se puede utilizar con seguridad durante el embarazo.⁷ La Administración de Alimentos y Medicamentos recomienda no negar su administración si se sospecha que una persona embarazada está sufriendo una sobredosis.⁸ La naloxona debe administrarse de inmediato, incluso si no se tiene la certeza de que la persona esté teniendo una sobredosis por opiáceos.

TRATAMIENTO EN EL EMBARAZO

A veces, cuando las personas se enteran de que están embarazadas, reflexionan sobre la posibilidad de cambiar su forma de consumir sustancias. Durante el embarazo, medicamentos como la metadona o la buprenorfina, junto con servicios de apoyo de asesoramiento y recuperación, pueden ayudar a tratar el trastorno por consumo de opiáceos.⁹⁻¹¹ Es importante que las mujeres embarazadas hablen con sus profesionales de la salud antes de dejar de tomar opiáceos, ya que esto puede causar problemas graves, como parto prematuro, sufrimiento fetal y aborto.^{10,12,13}

Para obtener ayuda para un trastorno por consumo de sustancias, hable con un profesional de la salud o llame a la [línea nacional de ayuda de La Administración de Salud Mental y Abuso de Sustancias \(Substance Abuse and Mental Health Services Administration; SAMHSA, por sus siglas en inglés\)](https://www.samhsa.gov), al 1-800-662-4357.

 FASD NATIONAL PARTNER NETWORK



MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL FENTANILO



bit.ly/3PBRK8u



REFERENCIAS

1. Department of Justice Drug Enforcement Administration. Drug Fact Sheet. <https://www.dea.gov/sites/default/files/2022-12/Fentanyl%202022%20Drug%20Fact%20Sheet.pdf>
2. National Institute on Drug Abuse. Fentanyl DrugFacts. <https://nida.nih.gov/publications/drugfacts/fentanyl>
3. Centers for Disease Control and Prevention. Stop Overdose: Fentanyl Facts. <https://www.cdc.gov/stop-overdose/caring/fentanyl-facts.html>
4. United States Drug Enforcement Administration. Fake Prescription Pills. <https://www.dea.gov/factsheets/fake-prescription-pills>
5. Mother To Baby. Fact Sheet: Fentanyl. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK582701/>
6. Centers for Disease Control and Prevention. Pregnancy: Polysubstance Use During Pregnancy. <https://www.cdc.gov/pregnancy/during/polysubstance-use.html>
7. Mother To Baby. Fact Sheet: Naloxone. <https://mothertobaby.org/fact-sheets/naloxone/pdf/>
8. Food and Drug Administration. Full Prescribing Information. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2023/208969s000lbl.pdf
9. Centers for Disease Control and Prevention. Overdose Prevention: Treatment for Opioid Use Disorder. <https://www.cdc.gov/overdose-prevention/treatment/opioid-use-disorder.html>
10. Centers for Disease Control and Prevention. Opioid Use During Pregnancy: Treatment for Opioid Use Disorder Before, During, and After Pregnancy. <https://www.cdc.gov/opioid-use-during-pregnancy/treatment/index.html>
11. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Opioid Use Disorder and Pregnancy: Taking Helpful Steps For a Healthy Pregnancy. <https://store.samhsa.gov/sites/default/files/sma18-5071fs1.pdf>
12. National Harm Reduction Coalition. Pregnancy and Substance Use: A Harm Reduction Toolkit. https://www.perinatalharmreduction.org/_files/ugd/a84b43_2a55dde92ba84950bff38f2a4c442b90.pdf
13. Centers for Disease Control and Prevention. Pregnancy and Opioid Pain Medications. https://www.cdc.gov/opioid-use-during-pregnancy/media/pdfs/pregnancy_opioid_pain_factsheet-a.pdf

Este proyecto cuenta con el apoyo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention; CDC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services; HHS, por sus siglas en inglés) de los EE. UU. como parte de un premio de asistencia económica financiado al 100 % por los CDC/HHS. El contenido es responsabilidad de los autores y no necesariamente representa las opiniones oficiales de los CDC/HHS ni del gobierno de los Estados Unidos, ni cuenta con su respaldo.